

COVID-19

Цифри і факти

5 177 217 підтверджених випадків COVID-19 в Україні з початку пандемії

33 696 996 щеплень проведено в Україні від початку вакцинальної кампанії

Динаміка випадків COVID-19 в Україні (37→38 тиждень 2022 р.)


+20,3 %
усі підтверджені випадки
36683→44137)

+4,5 %
підтверджені випадки серед дітей (5628→5882)

+78,9 %
померлі (усі) (90→161)

+1
померлі (діти) (2→1)

Кількість померлих у вікових групах в Україні (37 тиждень 2022 р.)



Світові показники вакцинації

67,7 %
населення світу отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19

20,9 %
людей у країнах із низьким рівнем доходу отримали хоча б одну дозу

12,58
мільярда доз було введено у всьому світі

4,74
мільйона доз вакцини вводиться зараз щодня
Джерело: ourworldindata.org

Накази МОЗ

- Наказ МОЗ України від 19.07.2022 № 1250:
- схвалено пріоритетні групи для отримання 2-ої бустерної дози вакцини проти COVID-19
- Наказ МОЗ України від 02.09.2022 № 1586:
- схвалено надати доступ для отримання 2-ої бустерної дози вакцини проти COVID-19 для усіх бажаючих при достатній кількості доз вакцин для осіб з групи пріоритету
- затверджено позицію НТГЕІ від 18.09.2022 про вакцинацію дітей віком 5-11 років та про гетерологічні схеми вакцинації.

Джерело: moz.gov.ua

Позиція НТГЕІ – № 18-08/2022

- НТГЕІ наголошує на важливості своєчасної вакцинації дітей проти інфекційних хвороб, вакцинація проти яких передбачена чинним Календарем щеплень
- Вакцинація проти COVID-19 дітей від 5 років є пріоритетною в групах ризику
- Переваги вакцинації для дітей проти COVID-19 виходять за рамки прямої користі для їх здоров'я.
- Рекомендовано скоротити інтервал до отримання 1-ї бустерної дози з 6 міс. до 5 міс. Інтервал між 1-ю та 2-ю бустерною дозою – 4 міс.
- Рекомендовано використовувати гетерологічні схеми щеплень для первинної вакцинації та бустерних доз.


Джерело: phc.org.ua

Новини науки

- Аналіз бази даних Vaccine Safety Datalink з безпеки та ефективності при одночасному введенні вакцин проти грипу та COVID-19 протягом епідемічного сезону грипу 2021 – 2022 років продемонстрував збереження ефективності та високого профілю безпеки.
- У проведеному дослідженні не було виявлено, що введення бустерної дози протягом 2 місяців (60 днів) після інфікування супроводжується додатковими перевагами в запобіганні повторного COVID-19. Проте виявлено зростання рівня нейтралізуючих антитіл.

Джерела: doi.org, [ACIP Meeting 109.2022](https://www.acipmeeting1092022.org)

Загальна кількість введених доз вакцин в Україні

Джерело: www.dec.gov.ua

«Гарячі» питання та відповіді на них

Питання: Чи можна поєднувати вакцини проти COVID-19 з вакцинами проти грипу?

Відповідь: Дозволено вводити вакцини проти грипу і в один день, і з будь-яким інтервалом після введенням будь-якої вакцини проти COVID-19, які схвалені до використання в Україні.

Питання: Якщо порушені інтервали введення доз вакцин проти COVID-19 – наприклад, не введена через 6 міс. бустерна доза, то чи потрібно починати все спочатку?

Відповідь: Ні, не потрібно починати схему вакцинації проти COVID-19 з самого початку. Введіть пропущену / пропущені дози за першої ж можливості.

Питання: Чи можна для бустерних доз використовувати вакцини від інших виробників/на інших платформах?

Відповідь: Так, можна. В Україні дозволено введення схвалених ВООЗ до використання в умовах надзвичайної ситуації (EUL) вакцин проти COVID-19 від різних виробників / на різних платформах для щеплення бустерними дозами.

Питання: Чи варто перед вакцинацією та після неї визначати антитіла до COVID-19?

Відповідь: Зазвичай тести для визначення антитіл до COVID-19, що доступні в лабораторіях, не призначені для виявлення антитіл, які утворюються в результаті вакцинації, тому вони не можуть виявити, чи є антитіла в необхідній кількості та якості для захисту від COVID-19.

Світова практика

США

Управління з продовольства і медикаментів США – FDA – дозволило використання нових бівалентних вакцин Pfizer та Moderna, які, окрім оригінального, також забезпечують окремо імунну відповідь до циркулюючого варіанту Омікрону (BA.4 and BA.5). Очікується, що така вакцина буде також ефективною проти ще не відомих штамів COVID-19, які можуть з'явитися цієї зими. Ці вакцини будуть доступні лише як бустер, з 12 та 18 років відповідно. Дозвіл для дітей із 5 років очікується в кінці жовтня.

ЄС

Адаптовані вакцини проти COVID-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1 і Spikevax бівалентна Original/Omicron BA.1 тепер дозволені в ЄС. Це стало можливим у результаті рішення Європейської комісії від 1 вересня 2022 року. Висновки Комітету з лікарських засобів для людини (CHMP) Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) будуть надіслані до Європейської комісії, яка ухвалить остаточне рішення.

Ірландія

- Для осіб віком понад 65 років та імунокомпроментованих дітей віком понад 12 років з липня запроваджено 3-й бустер, який вводиться з інтервалом в 4 міс., в окремих випадках – 3 міс.
- Вакцину проти COVID-19 можна вводити одночасно або з будь-яким інтервалом із живими та неживими вакцинами (включно з вакциною проти грипу та вакцинами, які вводять у школі).

Джерела: fda.gov, ema.europa.eu, hse.ie